

# Bulletin d'information

## Méningococcies

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre de l'année 2015:


- ◇ le centre de référence a confirmé 33 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 8 en janvier, 6 en février et 19 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 81,8% des cas; le sérotype C et Y dans, respectivement 3,0 % et 6,1 % des cas;
- ◇ 1 décès a été enregistré;
- ◇ 42,4% des cas ont été observés en Flandre, 42,4% en Wallonie et 12,1% à Bruxelles;
- ◇ 22 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 11 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 2,0)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 30,3% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 15,1% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1<sup>er</sup> trimestre de 2015 est légèrement supérieur à celui du 1<sup>er</sup> trimestre de 2014 (n=28).

### Distribution géographique des cas

Anvers	9,1%	Brabant wallon	3,0%
Brabant Flamand	6,1%	Hainaut	30,3%
Flandre occidentale	18,2%	Liège	6,1%
Flandre orientale	6,1%	Luxembourg	0%
Limbourg	3,0%	Namur	3,0%
Flandre	42,4%	Wallonie	42,4%

Distribution des cas par sérotype %



■ B ■ C ■ Y ■ Autres

Distribution des cas par âge

Age	N	%	M	F	B	C	décès
0-11m.	3	9,1	2	1	3	0	0
1-4a.	7	21,2	5	2	7	0	0
5-9a.	0	0,0	0	0	0	0	0
10-14a	3	9,1	1	2	3	0	0
15-19a.	5	15,2	5	0	5	0	0
20-24a.	2	6,1	2	0	2	0	0
25-44a.	3	9,1	3		2	0	0
45-64a.	3	9,1	1	2	2	0	0
>65a.	7	21,2	3	4	3	1	1
Total	33	100,0	22	11	27	1	1

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2015)

