


Bulletin d'information Méningococcies

Distribution des cas par séro groupe %



■ B ■ C ■ Y ■ Autres

Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2016:

- ◇ le centre de référence a confirmé 36 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 13 en janvier, 12 en février et 11 en mars;
- ◇ le séro groupe B a été retrouvé dans 69,4% des cas; le séro groupe C et Y dans 11,1 % des cas;
- ◇ 2 décès ont été enregistrés;
- ◇ 33,3% des cas ont été observés en Flandre, 58,3% en Wallonie et 8,3% à Bruxelles;
- ◇ 17 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 19 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,9)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 36,1% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 19,4% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1^{er} trimestre de 2016 est légèrement supérieur à celui du 1^{er} trimestre de 2015 (n=33).

Distribution des cas par âge

Age	N	%	M	F	B	C	décès
0-11m.	4	11.1	4	0	4	0	0
1-4a.	9	25.0	3	6	8	0	1
5-9a.	2	5.6	0	2	2	0	0
10-14a.	2	5.6	1	1	2	0	0
15-19a.	7	19.4	4	3	6	1	0
20-24a.	1	2.8	0	1	0	1	0
25-44a.	2	5.6	1	1	1	0	1
45-64a.	5	13.9	2	3	1	1	0
>65a.	4	11.1	2	2	1	1	0
Total	36	100,0	17	19	25	4	2

Distribution géographique des cas

Anvers	2,8%	Brabant wallon	5,6%
Brabant Flamand	5,1%	Hainaut	25,0%
Flandre occidentale	2,8%	Liège	16,7%
Flandre orientale	13,9%	Luxembourg	0%
Limbourg	8,3%	Namur	11,1%
Flandre	33,3%	Wallonie	58,3%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2004-2016

