


Bulletin d'information Méningococcies

Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2017:

- ◇ le centre de référence a confirmé 31 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 10 en janvier, 13 en février et 8 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 61,3% des cas; le sérotype Y dans 25,8 % des cas;
- ◇ 2 décès ont été enregistrés;
- ◇ 41,9% des cas ont été observés en Flandre, 48,4% en Wallonie et 9,7% à Bruxelles;
- ◇ 15 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 16 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,9)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 35,5% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 19,4% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1^{er} trimestre de 2017 est légèrement inférieur à celui du 1^{er} trimestre de 2016 (n=36).

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	M	F	B	C	décès
0-11m.	6	19,4	2	4	4	0	0
1-4a.	5	16,1	2	3	3	0	0
5-9a.	1	3,2	0	1	1	0	0
10-14a	1	3,2	1	0	1	0	1
15-19a.	6	19,4	3	3	2	0	1
20-24a.	3	9,7	1	1	2	0	0
25-44a.	3	9,7	2	1	2	1	1
45-64a.	5	16,1	2	3	4	0	0
>65a.	1	3,2	1	0	0	0	0
Total	31	100,0	15	16	19	1	2

Distribution géographique des cas

Anvers	3,2%	Brabant wallon	6,5%
Brabant Flamand	19,4%	Hainaut	19,4%
Flandre occidentale	9,7%	Liège	16,1%
Flandre orientale	6,5%	Luxembourg	0%
Limbourg	3,2%	Namur	6,5%
Flandre	41,9%	Wallonie	48,4%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2005-2017

