

Bulletin d'information


Méningococcies

Au cours du 2^{ème} trimestre de l'année 2014 :

- ◇ le centre de référence a confirmé 30 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 9 en avril, 15 en mai et 6 en juin;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 70,0% des cas; et le sérotype C et Y dans 13,3% des cas;
- ◇ 3 décès ont été enregistrés;
- ◇ 43,3% des cas ont été observés en Flandre, 40,0% en Wallonie et 16,7% à Bruxelles;
- ◇ 11 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 19 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,58);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 26,6% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 16,7% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 2^{ème} trimestre de 2014 est plus bas que celui du 2^{ème} trimestre de 2013 (n=35).

Distribution des cas par sérotype %
(deuxième trimestre)



Distribution des cas par âge

| Age | N | % | M | F | B | C | décès |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0-11m. | 3 | 10,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1-4a. | 5 | 16,7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5-9a. | 2 | 6,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10-14a | 1 | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15-19a. | 5 | 16,7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 20-24a. | 1 | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25-44a. | 5 | 16,7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 45-64a. | 3 | 10,0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| >65a. | 5 | 16,7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 30 | 100 | 11 | 19 | 21 | 4 | 3 |

Distribution géographique des cas

| | | | |
|---------------------|-------|----------------|-------|
| Anvers | 6,7% | Brabant wallon | 3,3% |
| Brabant Flamand | 10,0% | Hainaut | 13,3% |
| Flandre occidentale | 20,0% | Liège | 16,7% |
| Flandre orientale | 3,3% | Luxembourg | 3,3% |
| Limbourg | 3,3% | Namur | 3,3% |
| Flandre | 43,3% | Wallonie | 40,0% |

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2001-2014

