

# Bulletin d'information


## Méningococcies

Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2015 :

- ◇ le centre de référence a confirmé 25 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 8 en avril, 9 en mai et 8 en juin;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 56% des cas; le sérotype C dans 16% et le sérotype C et W135 dans 12% des cas;
- ◇ 1 décès a été enregistré;
- ◇ 52% des cas ont été observés en Flandre, 44% en Wallonie et 4% à Bruxelles;
- ◇ 13 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 12 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1,1);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 28% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 16% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre de 2015 est plus bas que celui du 2<sup>ème</sup> trimestre de 2014 (n=30).

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

| Age          | N         | %          | M         | F         | B         | C        | décès    |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0-11m.       | 7         | 28         | 5         | 2         | 3         | 2        | 1        |
| 1-4a.        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        |
| 5-9a.        | 3         | 12         | 2         | 1         | 3         | 0        | 0        |
| 10-14a       | 1         | 4          | 1         | 0         | 0         | 0        | 0        |
| 15-19a.      | 4         | 16         | 1         | 3         | 2         | 0        | 0        |
| 20-24a.      | 1         | 4          | 1         | 0         | 1         | 0        | 0        |
| 25-44a.      | 1         | 4          | 1         | 0         | 1         | 0        | 0        |
| 45-64a.      | 6         | 24         | 2         | 4         | 4         | 1        | 0        |
| >65a.        | 2         | 8          | 0         | 2         | 0         | 1        | 0        |
| <b>Total</b> | <b>25</b> | <b>100</b> | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>4</b> | <b>1</b> |

Distribution géographique des cas

|                     |     |                |     |
|---------------------|-----|----------------|-----|
| Anvers              | 20% | Brabant wallon | 0%  |
| Brabant Flamand     | 8%  | Hainaut        | 20% |
| Flandre occidentale | 16% | Liège          | 16% |
| Flandre orientale   | 8%  | Luxembourg     | 4%  |
| Limbourg            | 0%  | Namur          | 4%  |
| Flandre             | 52% | Wallonie       | 44% |

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2004-2015

