


# Bulletin d'information Méningococcies

Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2016 :

- ◇ le centre de référence a confirmé 28 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 13 en avril, 5 en mai et 10 en juin;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 57,1% des cas; le sérotype Y dans 17,9% et le sérotype W dans 10,7% des cas;
- ◇ 1 décès a été enregistré;
- ◇ 60,7% des cas ont été observés en Flandre, 32,1% en Wallonie et 7,1% à Bruxelles;
- ◇ 12 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 16 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,8);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 28,5% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 14,3% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre de 2016 est légèrement supérieur à celui du 2<sup>ème</sup> trimestre de 2015 (n=25).

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	M	F	B	C	décès
0-11m.	6	21.4	3	3	5	0	1
1-4a.	2	7.1	2	0	2	0	0
5-9a.	2	7.1	0	2	1	0	0
10-14a	1	3.6	0	1	1	0	0
15-19a.	4	14.3	3	1	2	0	0
20-24a.	1	3.6	1	0	1	0	0
25-44a.	3	10.7	0	3	1	1	0
45-64a.	7	25.0	3	4	3	1	0
>65a.	2	7.1	0	2	0	0	0
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100.0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Distribution géographique des cas

Anvers	21,4%	Brabant wallon	3,6%
Brabant Flamand	17,9%	Hainaut	7,1%
Flandre occidentale	7,1%	Liège	3,6%
Flandre orientale	3,6%	Luxembourg	0%
Limbourg	10,7%	Namur	17,9%
Flandre	60,7%	Wallonie	32,1%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2004-2016

