


Bulletin d'information Méningococcies

Au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2014 :

- ◇ le centre de référence a confirmé 8 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 3 en juillet, 2 en août et 3 en septembre;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 75% des cas; et le sérotype Y dans 25% des cas;
- ◇ Aucun décès n'a été enregistré;
- ◇ 37,5% des cas ont été observés en Flandre, 50% en Wallonie et 12,5% à Bruxelles;
- ◇ 3 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 5 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,6);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 62,5% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3^{ème} trimestre de 2014 est en forte diminution par rapport à celui du 3^{ème} trimestre de 2013 (n=22).

Distribution des cas par sérotype %
(deuxième trimestre)



■ B ■ C ■ Y ■ Autres

Distribution des cas par âge

Age	N	%	M	F	B	C	décès
0-11m.	3	37,5	2	1	2	0	0
1-4a.	2	25	0	2	2	0	0
5-9a.	0	0	0	0	0	0	0
10-14a	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	1	12,5	0	1	1	0	0
20-24a.	1	12,5	1	0	0	0	0
25-44a.	1	12,5	0	1	1	0	0
45-64a.	0	0	0	0	0	0	0
>65a.	0	0	0	0	0	0	0
NM	0	0	0	0	0	0	0
Total	8	100	3	5	6	0	0

Distribution géographique des cas

Anvers	0%	Brabant wallon	12,5%
Brabant Flamand	25%	Hainaut	25%
Flandre occidentale	0%	Liège	12,5%
Flandre orientale	12,5%	Luxembourg	0%
Limbourg	0%	Namur	0%
Flandre	37,5%	Wallonie	50%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2001-2014

■ B ■ C ■ Y ■ Autres

