


Bulletin d'information Méningococcies

Au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2015 :

- ◇ le centre de référence a confirmé 18 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 6 en juillet, 10 en août et 2 en septembre;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 50% des cas; et le sérotype Y ainsi que W135 dans 22,2% des cas;
- ◇ Un décès a été enregistré;
- ◇ 44,4% des cas ont été observés en Flandre, 38,8% en Wallonie et 5,5% à Bruxelles; (le code postal de 2 patients était inconnu).
- ◇ 8 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 10 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,8);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 27,7% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3^{ème} trimestre de 2015 est en forte augmentation par rapport à celui du 3^{ème} trimestre de 2014 (n=8).

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	M	F	B	C	décès
0-11m.	3	16.7	3	0	1	0	0
1-4a.	2	11.1	0	2	2	0	0
5-9a.	0	0	0	0	0	0	0
10-14a.	3	16.7	1	2	2	0	0
15-19a.	0	0	0	0	0	0	0
20-24a.	2	11.1	1	1	1	1	0
25-44a.	2	11.1	0	2	2	1	0
45-64a.	3	16.7	2	1	1	0	1
>65a.	3	16.7	1	2	0	2	0
Total	18	100	8	10	9	4	0

Distribution géographique des cas

Anvers	11,1%	Brabant wallon	0%
Brabant Flamand	5,6%	Hainaut	16,7%
Flandre occidentale	11,1%	Liège	11,1%
Flandre orientale	16,7%	Luxembourg	0%
Limbourg	0%	Namur	11,1%
Flandre	44,4%	Wallonie	38,8%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2004-2015

