


Bulletin d'information Méningococcies

Au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2016 :

- ◇ le centre de référence a confirmé 19 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 7 en juillet, 4 en août et 8 en septembre;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 68,4% des cas; le sérotype Y dans 21,1% et le C dans 10,5% des cas;
- ◇ Un décès a été enregistré;
- ◇ 47,4% des cas ont été observés en Flandre, 26,3% en Wallonie et à Bruxelles;
- ◇ 11 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 6 chez des personnes de sexe féminin. (ratio M/F = 1,8); Le genre de 2 patients n'est pas connu
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 21,1% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3^{ème} trimestre de 2016 est équivalent à celui du 3^{ème} trimestre de 2015 (n=18).

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	H	F	B	C	décès
0-11m.	1	5,3	1	0	1	0	0
1-4a.	3	15,8	2	0	3	0	0
5-9a.	3	15,8	0	3	3	0	1
10-14a.	2	10,5	1	1	2	0	0
15-19a.	1	5,3	1	0	0	0	0
20-24a.	3	15,8	3	0	1	1	0
25-44a.	2	10,5	1	1	0	1	0
45-64a.	2	10,5	1	0	1	0	0
>65a.	2	10,5	1	1	2	0	0
Total	19	100	11	6	13	2	1

Distribution géographique des cas

Anvers	10,5%	Brabant wallon	0%
Brabant Flamand	10,5%	Hainaut	5,3%
Flandre occidentale	0%	Liège	21,1%
Flandre orientale	15,8%	Luxembourg	0%
Limbourg	10,5%	Namur	0%
Flandre	47,4%	Wallonie	26,3%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2004-2016

