

Bulletin d'information


Méningococcies

Au cours de l'année 2016:

- ◇ le centre de référence a confirmé 108 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* (taux d'incidence annuel=0,96/100.000);
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 63,9% des cas, et le sérotype C dans 8,3% des cas;
- ◇ 6 décès (4B, 2W135) ont été enregistrés (CFR = 5,6%);
- ◇ 45,4% des cas ont été observés en Flandre, 41,7% en Wallonie et 12,0% à Bruxelles;
- ◇ 51 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 57 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,89);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 27,8% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans, 13,9% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés en 2016 était plus élevé que celui de 2015 (n = 98)

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	H	F	B	C	décès
0-11m.	12	11.1	7	5	10	0	1
1-4a.	18	16.7	11	7	15	0	1
5-9a.	8	7.4	1	7	7	0	1
10-14a	7	6.5	3	4	7	0	0
15-19a.	15	13.9	7	8	10	1	0
20-24a.	8	7.4	4	4	3	2	1
25-44a.	13	12.0	5	8	7	2	2
45-64a.	16	14.8	8	8	6	2	0
>65a.	11	10.2	5	6	4	2	0
Total	108	100	51	57	69	9	6

Distribution géographique des cas

Anvers	12,0%	Brabant wallon	2,8%
Brabant Flamand	10,2%	Hainaut	11,1%
Flandre occidentale	4,6%	Liège	14,8%
Flandre orientale	12,2%	Luxembourg	0,9%
Limbourg	11,1%	Namur	12,0%
Flandre	45,4%	Wallonie	41,7%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2004-2016

