

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Tijdens het eerste trimester van 2014:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 28 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 3 in januari, 11 in februari en 14 in maart;
- ◇ werd in 71,4% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 14,3% serogroep C en serogroep Y
- ◇ werd er 1 letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 32,1% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 42,8% in Wallonië en 25,0% in Brussel;
- ◇ werden er 16 stammen geïsoleerd bij mannen en 11 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 1,4);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 42,9% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar 10,7%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2014 is lager dan dat van het eerste trimester van 2013 (n=44).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	7,1%	Waals-Brabant	3,6%
Vlaams-Brabant	10,7%	Henegouwen	14,3%
West-Vlaanderen	7,1%	Luik	25,0%
Oost-Vlaanderen	7,1%	Luxemburg	0%
Limburg	0%	Namen	0%
Vlaanderen	32,1%	Wallonië	42,8%

Verdelingen van de gevallen per serogroep % (eerste trimester)



■ B ■ C ■ Y ■ Andere

Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	6	21,4	4	2	5	1	0
1-4j.	6	21,4	3	3	6	0	0
5-9j.	3	10,7	1	2	1	1	0
10-14j.	2	7,1	2	0	2	0	0
15-19j.	3	10,7	3	0	3	0	0
20-24j.	1	3,6	1	0	0	0	1
25-44j.	1	3,6	0	0	1	0	0
45-64j.	3	10,7	1	2	1	1	0
≥65j.	3	10,7	1	2	1	1	0
Totaal	28	100	16	11	20	4	1

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2001-2014)

