


INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



■ B ■ C ■ Y ■ Andere

Tijdens het eerste trimester van 2015:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 33 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 8 in januari, 6 in februari en 19 in maart;
- ◇ werd in 81,8% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 3,3% en 6,1% respectievelijk serogroep C en Y;
- ◇ werd er 1 letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 42,4% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 42,4% in Wallonië en 12,1% in Brussel;
- ◇ werden er 22 stammen geïsoleerd bij mannen en 11 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 2,0);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 30,3% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 15,1%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2015 is iets lager dan dat van het eerste trimester van 2014 (n=28).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	9,1%	Waals-Brabant	3,0%
Vlaams-Brabant	6,1%	Henegouwen	30,3%
West-Vlaanderen	18,2%	Luik	6,1%
Oost-Vlaanderen	6,1%	Luxemburg	0%
Limburg	3,0%	Namen	3,0%
Vlaanderen	42,4%	Wallonië	42,4%

Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	3	9,1	2	1	3	0	0
1-4j.	7	21,2	5	2	7	0	0
5-9j.	0	0,0	0	0	0	0	0
10-14j.	3	9,1	1	2	3	0	0
15-19j.	5	15,2	5	0	5	0	0
20-24j.	2	6,1	2	0	2	0	0
25-44j.	3	9,1	3		2	0	0
45-64j.	3	9,1	1	2	2	0	0
≥65j.	7	21,2	3	4	3	1	1
Totaal	33	100,0	22	11	27	1	1

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2015)

