

INFOBLAD


Meningokokkeninfecties

Tijdens het eerste trimester van 2017:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 31 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 10 in januari, 13 in februari en 8 in maart;
- ◇ werd in 61,3% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 25,8% serogroep Y.
- ◇ werden er 2 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 41,9% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 48,4% in Wallonië en 9,7% in Brussel;
- ◇ werden er 15 stammen geïsoleerd bij mannen en 16 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,9);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 35,5% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 19,4%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2017 is iets lager dan dat van het eerste trimester van 2016 (n=36).

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	6	19,4	2	4	4	0	0
1-4j.	5	16,1	2	3	3	0	0
5-9j.	1	3,2	0	1	1	0	0
10-14j	1	3,2	1	0	1	0	1
15-19j.	6	19,4	3	3	2	0	1
20-24j.	3	9,7	1	1	2	0	0
25-44j.	3	9,7	2	1	2	1	1
45-64j.	5	16,1	2	3	4	0	0
≥65j.	1	3,2	1	0	0	0	0
Totaal	31	100,0	15	16	19	1	2

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	3,2%	Waals-Brabant	6,5%
Vlaams-Brabant	19,4%	Henegouwen	19,4%
West-Vlaanderen	9,7%	Luik	16,1%
Oost-Vlaanderen	6,5%	Luxemburg	0%
Limburg	3,2%	Namen	6,5%
Vlaanderen	41,9%	Wallonië	48,4%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2005-2017)

