


INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



■ B ■ C ■ Y ■ Andere

Tijdens het eerste trimester van 2016:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 36 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 13 in januari, 12 in februari en 11 in maart;
- ◇ werd in 69,4% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 11,1% serogroep C en Y;
- ◇ werden er 2 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 33,3% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 58,3% in Wallonië en 8,3% in Brussel;
- ◇ werden er 17 stammen geïsoleerd bij mannen en 19 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,9);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 36,1% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 19,4%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2016 is iets hoger dan dat van het eerste trimester van 2015 (n=33).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	2,8%	Waals-Brabant	5,6%
Vlaams-Brabant	5,1%	Henegouwen	25,0%
West-Vlaanderen	2,8%	Luik	16,7%
Oost-Vlaanderen	13,9%	Luxemburg	0%
Limburg	8,3%	Namen	11,1%
Vlaanderen	33,3%	Wallonië	58,3%

Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	4	11.1	4	0	4	0	0
1-4j.	9	25.0	3	6	8	0	1
5-9j.	2	5.6	0	2	2	0	0
10-14j	2	5.6	1	1	2	0	0
15-19j.	7	19.4	4	3	6	1	0
20-24j.	1	2.8	0	1	0	1	0
25-44j.	2	5.6	1	1	1	0	1
45-64j.	5	13.9	2	3	1	1	0
≥65j.	4	11.1	2	2	1	1	0
Totaal	36	100,0	17	19	25	4	2

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2016)

