

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2014:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 30 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 9 in april, 15 in mei en 6 in juni;
- ◇ werd in 70,0% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 13,3% serogroep C en serogroep Y
- ◇ werden er 3 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 43,3% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 40,0% in Wallonië en 16,7% in Brussel;
- ◇ werden er 11 stammen geïsoleerd bij mannen en 19 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,58);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 26,6% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar 16,7%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2014 is lager dan dat van het tweede trimester van 2013 (n=35).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	6,7%	Waals-Brabant	3,3%
Vlaams-Brabant	10,0%	Henegouwen	13,3%
West-Vlaanderen	20,0%	Luik	16,7%
Oost-Vlaanderen	3,3%	Luxemburg	3,3%
Limburg	3,3%	Namen	3,3%
Vlaanderen	43,3%	Wallonië	40,0%

Verdelingen van de gevallen per serogroep % (tweede trimester)



■ B ■ C ■ Y ■ Andere

Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	3	10,0	2	1	3	0	0
1-4j.	5	16,7	2	3	4	0	0
5-9j.	2	6,7	1	1	2	0	0
10-14j	1	3,3	1	0	1	0	0
15-19j.	5	16,7	2	3	3	1	1
20-24j.	1	3,3	1	0	1	0	0
25-44j.	5	16,7	1	4	3	1	0
45-64j.	3	10,0	0	3	1	1	1
≥65j.	5	16,7	1	4	3	1	1
Totaal	30	100	11	19	21	4	3

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2001-2014)

