

# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2016:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 28 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 13 in april, 5 in mei en 10 in juni;
- ◇ werd in 57,1% van de gevallen serogroep B gevonden, in 17,9% serogroep Y en in 10,7% serogroep W;
- ◇ werd er 1 letale geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 60,7% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 32,1% in Wallonië en 7,1% in Brussel;
- ◇ werden er 12 stammen geïsoleerd bij mannen en 16 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,8);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 28,5% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 14,3%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2016 is iets hoger dan dat van het tweede trimester van 2015 (n=25).

### Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	21,4%	Waals-Brabant	3,6%
Vlaams-Brabant	17,9%	Henegouwen	7,1%
West-Vlaanderen	7,1%	Luik	3,6%
Oost-Vlaanderen	3,6%	Luxemburg	0%
Limburg	10,7%	Namen	17,9%
Vlaanderen	60,7%	Wallonië	32,1%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



### Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	6	21.4	3	3	5	0	1
1-4j.	2	7.1	2	0	2	0	0
5-9j.	2	7.1	0	2	1	0	0
10-14j	1	3.6	0	1	1	0	0
15-19j.	4	14.3	3	1	2	0	0
20-24j.	1	3.6	1	0	1	0	0
25-44j.	3	10.7	0	3	1	1	0
45-64j.	7	25.0	3	4	3	1	0
≥65j.	2	7.1	0	2	0	0	0
Totaal	28	100.0	12	16	16	2	0

### Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2016)

