

INFOBLAD


Meningokokkeninfecties

Tijdens het derde trimester van 2014:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 8 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 3 in juli, 2 in augustus en 3 in september;
- ◇ werd in 75% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 25% serogroep Y;
- ◇ werd er geen letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 37,5% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 50% in Wallonië en 12,5% in Brussel;
- ◇ werden er 3 stammen geïsoleerd bij mannen en 5 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,6);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 62,5% van de gevallen.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het derde trimester van 2014 is sterk gedaald in vergelijking met het derde trimester van 2013 (n=22).

Verdelingen van de gevallen per serogroep % (tweede trimester)



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	3	37,5	2	1	2	0	0
1-4j.	2	25	0	2	2	0	0
5-9j.	0	0	0	0	0	0	0
10-14j	0	0	0	0	0	0	0
15-19j.	1	12,5	0	1	1	0	0
20-24j.	1	12,5	1	0	0	0	0
25-44j.	1	12,5	0	1	1	0	0
45-64j.	0	0	0	0	0	0	0
≥65j.	0	0	0	0	0	0	0
NG	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	8	100	3	5	6	0	0

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	0%	Waals-Brabant	12,5%
Vlaams-Brabant	25%	Henegouwen	25%
West-Vlaanderen	0%	Luik	12,5%
Oost-Vlaanderen	12,5%	Luxemburg	0%
Limburg	0%	Namen	0%
Vlaanderen	37,5%	Wallonië	50%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2001-2014)

