

INFOBLAD


Meningokokkeninfecties

Tijdens het derde trimester van 2015:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 18 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 6 in juli, 10 in augustus en 2 in september;
- ◇ werd in 50% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 22,2% serogroep Y en W135;
- ◇ werd één letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 44,4% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 38,8% in Wallonië en 5,5% in Brussel (de postcode was onbekend voor twee patiënten);
- ◇ werden er 8 stammen geïsoleerd bij mannen en 10 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,8);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 27,7% van de gevallen.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het derde trimester van 2015 is sterk gestegen in vergelijking met het derde trimester van 2014 (n=8).

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	3	16.7	3	0	1	0	0
1-4j.	2	11.1	0	2	2	0	0
5-9j.	0	0	0	0	0	0	0
10-14j	3	16.7	1	2	2	0	0
15-19j.	0	0	0	0	0	0	0
20-24j.	2	11.1	1	1	1	1	0
25-44j.	2	11.1	0	2	2	1	0
45-64j.	3	16.7	2	1	1	0	1
≥65j.	3	16.7	1	2	0	2	0
Totaal	18	100	8	10	9	4	0

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	11,1%	Waals-Brabant	0%
Vlaams-Brabant	5,6%	Henegouwen	16,7%
West-Vlaanderen	11,1%	Luik	11,1%
Oost-Vlaanderen	16,7%	Luxemburg	0%
Limburg	0%	Namen	11,1%
Vlaanderen	44,4%	Wallonië	38,8%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2015)

