

INFOBLAD


Meningokokkeninfecties

Tijdens het derde trimester van 2016:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 19 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 7 in juli, 4 in augustus en 8 in september;
- ◇ werd in 68,4% van de gevallen serogroep B gevonden, in 21,1% serogroep Y en in 10,5% serogroep C;
- ◇ werd één letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 47,4% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 26,3% in Wallonië en Brussel
- ◇ werden er 11 stammen geïsoleerd bij mannen en 6 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,8); het geslacht was onbekend voor twee patiënten);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 21,1% van de gevallen.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het derde trimester van 2016 is sterk gelijkaardig met het derde trimester van 2015 (n=18).

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

| Leeftijd | N | % | M | V | B | C | doden |
|----------|----|------|----|---|----|---|-------|
| 0-11m. | 1 | 5,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-4j. | 3 | 15,8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5-9j. | 3 | 15,8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10-14j | 2 | 10,5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15-19j. | 1 | 5,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24j. | 3 | 15,8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25-44j. | 2 | 10,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45-64j. | 2 | 10,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ≥65j. | 2 | 10,5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 19 | 100 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 |

Geografische spreiding van de gevallen

| | | | |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| Antwerpen | 10,5% | Waals-Brabant | 0% |
| Vlaams-Brabant | 10,5% | Henegouwen | 5,3% |
| West-Vlaanderen | 0% | Luik | 21,1% |
| Oost-Vlaanderen | 15,8% | Luxemburg | 0% |
| Limburg | 10,5% | Namen | 0% |
| Vlaanderen | 47,4% | Wallonië | 26,3% |

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2016)

