

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

In 2014:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 87 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken (jaarlijkse incidentie = 0,78/100.000);
- ◇ werd in 69,0% van de gevallen serogroep B teruggevonden en in 10,3% serogroep C;
- ◇ werden er 6 letale gevallen (2B, 1W135, 3Y) gemeld aan het referentiecentrum (CFR = 6,9%);
- ◇ werd 41,4% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 39,1% in Wallonië en 19,5% in Brussel;
- ◇ werden er 40 stammen geïsoleerd bij mannen en 47 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,85);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 37,9% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 13,8%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen in 2014 was opmerkelijk lager dan in 2013 (n =134).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	5,7%	Waals-Brabant	3,4%
Vlaams-Brabant	11,5%	Henegouwen	12,6%
West-Vlaanderen	11,5%	Luik	18,4%
Oost-Vlaanderen	10,3%	Luxemburg	1,5%
Limburg	2,3%	Namen	3,4%
Vlaanderen	41,4%	Wallonië	39,1%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



■ B ■ C ■ Y ■ Andere

Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	V	B	C	doden
0-11m.	15	17.2	8	7	11	1	0
1-4j.	18	20.7	8	10	16	0	0
5-9j.	7	8.0	3	4	5	1	0
10-14j	5	5.7	3	1	3	1	0
15-19j.	12	13.8	7	6	11	1	1
20-24j.	4	4.6	3	1	2	0	1
25-44j.	8	9.2	3	5	6	1	0
45-64j.	7	8.0	2	5	2	2	2
>65j.	11	12.6	3	8	4	2	2
Totaal	87	100	40	47	60	9	6

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2001-2014)

