

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

In 2016:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 108 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken (jaarlijkse incidentie = 0.96/100.000);
- ◇ werd in 63,9% van de gevallen serogroep B teruggevonden en in 8,3% serogroep C;
- ◇ werden er 6 letale gevallen (4B, 2W135) gemeld aan het referentiecentrum (CFR = 5,6%);
- ◇ werd 45,4% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 41,7% in Wallonië en 12,0% in Brussel;
- ◇ werden er 51 stammen geïsoleerd bij mannen en 57 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,89);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 27,8% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 13,9%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen in 2016 was hoger dan in 2015 (n =98).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	12,0%	Waals-Brabant	2,8%
Vlaams-Brabant	10,2%	Henegouwen	11,1%
West-Vlaanderen	4,6%	Luik	14,8%
Oost-Vlaanderen	12,2%	Luxemburg	0,9%
Limburg	11,1%	Namen	12,0%
Vlaanderen	45,4%	Wallonië	41,7%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	V	B	C	doden
0-11m.	12	11.1	7	5	10	0	1
1-4j.	18	16.7	11	7	15	0	1
5-9j.	8	7.4	1	7	7	0	1
10-14j	7	6.5	3	4	7	0	0
15-19j.	15	13.9	7	8	10	1	0
20-24j.	8	7.4	4	4	3	2	1
25-44j.	13	12.0	5	8	7	2	2
45-64j.	16	14.8	8	8	6	2	0
>65j.	11	10.2	5	6	4	2	0
Totaal	108	100	51	57	69	9	6

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2016)

